

REG. SAGARPA: C-9673-002



Oxi-AC LA 20%

Oxitetraciclina Dihidratada

Antibiótico de
Amplio Espectro
y Larga Acción



■ www.alfacentaurilabs.com

Oxi-AC LA 20%

Oxitetraciclina Dihidratada

Antibiótico de Amplio Espectro y Larga Acción

DESCRIPCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro y larga acción formulado a base de Oxitetraciclina Dihidratada en solución acuosa, con efecto bacteriostático. Indicado en el tratamiento de enfermedades comunes de los animales originadas por gérmenes gram (+) y gram (-). Los componentes de su fórmula le confieren una excelente biodisponibilidad y absorción controlada y prolongada en el sitio de inyección del antibiótico. Altamente soluble en agua y no produce irritación, por lo que se puede utilizar en infusiones intrauterinas.



Fórmula: Cada 1 ml contiene:

Oxitetraciclina	200 mg
Vehículo, c.b.p.	1 ml

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, no permitiendo la unión de la (tRNA).

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y control de las enfermedades causadas por gérmenes susceptibles a la acción de este antibiótico como bacterias gram (+) y gram (-), mycoplasmas, rickettsias y protozoarios.

USOS EN: Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Bovinos: Tratamiento de anaplasmosis, neumonías, leptospirosis, gabarro, mastitis sistémica, pierna negra, actinobacilosis, artritis infecciosa, ojo rosado y heridas infectadas.

Porcinos: Neumonía enzoótica, afecciones respiratorias, leptospirosis, erisipela, mastitis sistémica, artritis infecciosa e infecciones por heridas expuestas. En la prevención y control de la pasteurelosis neumónica y síndrome MMA.

Ovinos y Caprinos: Tratamiento de la neumonía infecciosa, aborto enzoótico, pierna negra, gabarro, mastitis sistémica, artritis infecciosa y heridas infectadas.

DOSIS ÚNICA:

1 ml por cada 10 kgs de peso vivo. Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS:

No aplicar este producto el mismo día en que se aplica hierro en lechones.

No administre este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No destinar la leche de los animales tratados a consumo sino hasta después de 60 horas de la última aplicación. Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 100 ml, 250 ml y 500 ml.



HECHO EN MÉXICO PARA:

Medical Suppliers Veterinaria, S.A. de C.V.
Av. Matamoros No. 1419, Col. Centro
Torreón, Coahuila. C.P. 27000 México
Teléfono: 52 (871) 711 1818

www.alfacentaurilabs.com